

Wintergerste, zweizeilig

CANBERRA



2009 vom Bundessortenamt zugelassen

Agronomische Eigenschaften

- Überdurchschnittliche Standfestigkeit
- **Äußerst strohstabil**

Resistenz gegenüber Krankheiten

- Gelbmosaikvirusresistent
- Ausgezeichnete Mehлтаuresistenz


Ertragsleistung

- **Auffallend hohe Ertragsstabilität über verschiedenste Anbaubedingungen und Umwelten**
- Spitzenerträge in den Landessortenversuchen 2009-2010

Empfehlungen

- Robuste Sorte mit uneingeschränkter Standorteignung
- Überragende Hektolitergewichte bieten hohen energetischen Futterwert
- Gute Kornausbildung und Sortierung
- **Zum Anbau in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und für alle Löss- sowie V-Standorte Ostdeutschlands offiziell empfohlen**

CANBERRA – Platz 1 im Kornertrag LSV Wintergerste zweizeilig 2009-2010



Quelle: Amtliches Versuchswesen der Länder 2010
¹Stufe 2, ²2010, ³GMV resistente Sorten

Diese Sortenbeschreibung ist von uns sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur übernehmen, da dies auch von unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

Wintergerste, zweizeilig

CANBERRA



2009 vom Bundessortenamt zugelassen

Anbau- und Sortenhinweise

Sortentyp:	zweizeilige Wintergerste
Standorteignung:	alle Lagen
Ertragsaufbau:	
- Bestandesdichte	sehr hoch - hoch
- Kornzahl/Ähre	gering - sehr gering
- Tausendkorngewicht	hoch
Kornertrag:	sehr hoch - hoch
Reife:	mittel - spät
Winterhärte:	mittel
Saatzeit/Saatstärke¹:	
- früh - mittel	270 - 300
- mittel - spät	310 - 350
N-Düngung (kg/ha) z.B.:	
- Startgabe EC 29	50 - 60
- Schoßgabe EC 30/31	30 - 40
- Ertragsgabe ab EC 39/49	40 - 60
Pflanzenlänge:	kurz - mittel
Standfestigkeit:	gut - mittel
Strohstabilität:	gut
Wachstumsreglerbedarf:	
Tendenz zu ortsüblich	mittel
Krankheitsresistenzen²:	
- Mehltau	+++
- Netzflecken	o
- Rhynchosporium	o
- Zwergrost	-
- Gelbmosaikvirus (Typ 1)	resistent
- Ramularia, PLS ³	+

¹keimfähige Körner je m² bei normalen Bestellbedingungen² ++++ sehr gut, +++ sehr gut bis gut, ++ gut, + mittel bis gut, o mittel, - mittel bis gering, -- gering³Toleranz, PLS = nichtparasitäre Blattverbräunung

Wintergerste, zweizeilig

CANBERRA



2009 vom Bundessortenamt zugelassen

Einstufung nach BSA

Wachstum:

- Ährenschieben	6
- Reife	6
- Pflanzenlänge	4
- Auswinterung	-
- Lager	4
- Halmknicken	3
- Ährenknicken	3

Anfälligkeit für:

- Mehltau	2
- Netzflecken	5
- Rhynchosporium	4
- Zwergrost	6
- Gelbmosaikvirus	1

Ertrag:

- Bestandesdichte	8
- Kornzahl/Ähre	2
- Tausendkornmasse	7
- Kornertrag Stufe 1	7
- Kornertrag Stufe 2	7

Qualität:

- Marktwareanteil	8
- Vollgersteanteil	7
- Hektolitergewicht	7
- Eiweißgehalt	4

Quelle: Bundessortenamt 2010

